

性病治療院

避毒壯陽丸 治男子腎關  
腎虧陽萎遺精早洩乾道不固下元虛損  
望能快元固精添精益髓內服外搽立  
見奇效每罐每盒二元

節育避孕粉 之功通經活  
血之妙雖生產常帶之婦女連服二料  
立即止孕而體健如常日後受孕者  
服過陽丹又能復產每盒一元二料四  
元有孕者服千金通經丸無論五胎自  
包好白濁丸 治婦女白帶赤帶  
小便紅立止每合一元外埠函購寄費  
加一

四馬路丹桂  
第一台隔壁  
中南藥房

女科  
專家**惠爾康** 停經怕育  
保經通經  
○月經不調 婚久不育 ○停經乾血  
○赤白帶下 ○限日全愈  
(取名帶下丹)此丹有調經補孕之功  
去瘀生新之效每日服一丸開水送下百  
無一失(每瓶五元)  
如五個月之外者另用降生錠一枚莫  
外兼治定能奏效神速(每錠十元)  
保身如育丸九粒為限服外用培元固腎  
滋精益髓之絕對聖藥每瓶每瓶一元  
仿單另詳向有……外用選孕丸效能  
避毒避臭節制生育萬無流弊為一  
以奉有之選孕良藥每盒一元郵匯  
加一郵票九五索寄附郵上海英租界  
三馬路石路東勒威大藥房經理

大常識

聞所未聞見所未見得第一篇獲益非淺每冊售洋一元預約八折出  
內概贈彙刊一冊祕密鏡報三月實際售費洋四角得閱本報全年便宜  
本報者請速定閱款請接覽郵匯或親至上海大通路培德里十號本館

緊要啓事 本報並未漲價本埠仍售銅元二枚請閱者注意

敬告讀者 (編)

報出版以還。瞬屆五十七期。承讀者愛護。時錫褒語。他

特舉下列各點。敬告讀者  
讀者介紹……愛護……鑑別

(一)不貪便宜印刷。惟利是圖

（不用劣紙。以博微利。）  
（不刊空泛劣稿。敷衍塞責。）

（四）不登陳腐銅版。徒佔篇幅，不用無識之輩。充任校對，不任意說期。

述六項。本報始終是一。堅底。孰優孰劣。孰是孰非。

如讀者必能洞悉。本報全人  
武斷。尙祈閱者諸君加以公  
批評。以爲別。此望愛護

諸君。努力介紹。而本報同  
當奮勉從事。力圖改良。以

君之厚意焉。

如有水火燙傷。一時無從就

即向南京路大慶里養和堂  
君診治。隨請隨到。不取分

養和室白濁粉  
 萬無一失 永無復發  
 五淋聖藥 完全除根 出清新毒 危險淋濁 萬病  
 主顧認明 每料大洋二角五分  
 分售處 總發行所 南京大馬路 四馬路 二馬路 五馬路  
 馬六甲 六馬路 各烟紙號均有出售

**也是唯一食品公司**  
**擇十二日正式開幕**  
 時新炒菜    冷飲食品    改良麵點    隨意小吃  
 招待如意    美艷子女    西式茶點

三馬路大舞台西廿七號(電話中央八一五號)

記 林

更 新 舞 台

新 排 燈 彩 機 關 好 戲

天 上 牛 宮

今 晚 開 演

奉 送 戒 煙 妙 諦

善戒鴉片、  
有戒烟譜一  
詳載戒烟妙  
法、頗有心得  
茲特印贈千  
、兩索附郵一  
寄至上海大  
路培德里十  
大常匯報館、  
當即寄奉一  
、空函無效、

## 職業

### 第五十七期

（日九月四年八十國民華中）

（號十里德培路通大海上 址館）

**廣告價目**

每期每條五元  
每條十四字高六  
行闊一新聞中  
長期面議

**定報價目**

每三日出張一  
外埠九個月一元  
全年二元寄費在  
內國外定報照價  
加倍郵費代現九  
五計值

## 集刊預約通告

○本報第一集集刊自第一期至五十期業已付郵矣。諸君如欲購者，請向本館或各埠代售處定購。每冊定價大洋四角，得閱本報全年，便宜之至。如此良機，幸勿失之交臂。愛閱。

非淺每冊售洋一元，預約八折出售。截止定購，全年計洋二元。郵費在內。如欲購者，請向本館或各埠代售處定購。每冊定價大洋四角，得閱本報全年，便宜之至。如此良機，幸勿失之交臂。愛閱。

上海大通路培德里十號本館

衛生局因鑒於邇來各地時疫流行傳染甚廣。前經發出諭諭市區及時疫預防佈告。示為備失事。照得日來流行性腦脊膜炎及腹瀉症。流行各地。本市亦間有發生。查該兩病均係危險之症。能傳染於人。尤多殘犯不見。往往於短時間內。即可死亡。本局為預防此症。健康起見。用特印錄該兩病之簡明病狀及重要預防方法。示仰市民一體知照。特此佈告。

(一)流行性腦脊膜炎。症候如下

突然發生。發熱。高熱度及劇烈頭痛。以後頸部尤甚。往往於發病之初。屈之膝部。不能向上屈。患者又有嘔吐吐瀉。其發病乃反發。眼目紅腫。鼻涕等症。數日內即行死亡。(預防方法)

(二)患者須與家人隔離。不與同室。勿許近接。口鼻之排泄物。如唾涎鼻涕等傳染。故市民自備白紗口罩。當本病流行時。應立即送往醫院診察。

(三)患者須與家人隔離。不與同室。勿許近接。口鼻之排泄物。如唾涎鼻涕等傳染。故市民自備白紗口罩。當本病流行時。應立即送往醫院診察。

(四)患者須與家人隔離。不與同室。勿許近接。口鼻之排泄物。如唾涎鼻涕等傳染。故市民自備白紗口罩。當本病流行時。應立即送往醫院診察。

(五)公共場所暫以少去為安。尤為重要。並須時常更換。將夜有燒燬。(五)公共場所暫以少去為安。尤為重要。並須時常更換。將夜有燒燬。

(六)報告本局以便派員實施消毒。並指示一切。(七)腹瀉症。症候如下

則潮紅腫脹。(最要注意)古有言在第二三日發生疹子。先由頭紅腫。胸背部發紅及四肢。舌則紅腫鮮紅如細舌。通常在發病後七八日內即全身脫皮而愈。但患者有合併症。或病勢險惡。一二日內即可死亡。應早食(預防方法)

(一)速將可疑之患者送入醫院隔離治療。應早食(一)患者衣物用品。均要消毒。(三)家中人均勿與之接觸。報告本局以便派員到家實施消毒。

時疫 預防 請閱本文 (考記)



那查票員大搖大擺的，把那票解給他，那查票員銅板裏罵道：「嘿，你還不當我老洋鬼子，你這票解給我，快些出銅板買票。」那人斯時莫明其甚，隨聲問道：「這裏就是方塘向賣票人買的，爲什麼又要我買呢？」查票員各道：「這票就是無號碼。」那人入至此，雖欲發聲，亦沒法想了。祇能再出銅元買票而已。凡乘電車者，多喜合車票於口內，稍不留心，每就號碼含脫，今特述之，以寄本報。同病者戒。